

12.10.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Йодиол

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс»,
610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.)

Номер регистрационного удостоверения:
24-3-25.13-3397№ПВР-3-2.9/00331

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Йодиол (Iodinolum).

Группировочные наименования: йод, калия йодид.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Йодиол в 100 мл содержит в качестве действующих веществ 0,1 г йода, 0,3 г калия йодида, а в качестве вспомогательных веществ спирт поливиниловый и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость темно-синего цвета.

Срок годности Йодиола в закрытой упаковке организации-производителя при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства.

Запрещается применять Йодиол после окончания срока годности.

4. Выпускают Йодиол расфасованным по 100, 330 мл; 1; 5; 10 л в емкости полимерные коричневого или синего цвета с навинчиваемыми крышками или навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от плюс 3 до плюс 25° С.

6. Йодиол следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Йодиол относится к фармакотерапевтической группе: антисептики и дезинфицирующие средства.

10. Йодиол обладает широким антимикробным спектром действия по отношению к грамположительной и грамотрицательной микрофлоре. Основным действующим веществом Йодиола является молекулярный йод, обладающий антисептическими свойствами; поливиниловый спирт замедляет выделение йода и удлиняет его взаимодействие с тканями организма, а также уменьшает раздражающее действие йода на ткани.

При контакте со слизистыми оболочками Йодиол частично всасывается, выделяется главным образом почками, кишечником, потовыми железами.

По степени воздействия на организм Йодиол согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Йодинол применяют для лечения желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии у телят и поросят.

12. Противопоказанием к применению Йодинола является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При применении Йодинола следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Йодинолом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Специальные исследования на беременных и кормящих самках, а также на новорожденных животных не проводились. Возможность применения препарата этим группам животных определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы к возможному риску его применения.

15. Йодинол назначают внутрь ежедневно 2 раза в сутки в течение 7-10 дней в следующих дозах:

телятам	1,5 мл/кг
поросятам	2,0 мл/кг

Рассчитанную для теленка или поросенка индивидуальную дозу Йодинола разводят непосредственно перед применением кипяченой водой или физиологическим раствором в соотношении 1:2-1:5.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Йодинола в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его применение прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Йодинол не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для приема внутрь.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, применение препарата следует возобновить в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Йодинола в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.