ИНСТРУКЦИЯ
по применению Синбиотик D-C
для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта у собак

(организация-производитель фирма «ADM Protexin® Ltd.» /
«АДМ Протексин Лтд.», Великобритания)

I. Общие сведения

1. Синбиотик D-C (Synbiotic D-C) – кормовая добавка, предназначенная для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта у собак.

2. Кормовая добавка в одной капсуле содержит содержит: микробную массу живых бактерий *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415) - не менее 2 х 10^9 КОЕ, фруктоолигосахариды – 71,3 мг, гуммиарабик – 71,3 мг, стеарат магния – 0,8 мг.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой бежевый сыпучий порошок в белых или прозрачных желатиновых капсулах, размером 13,6±4 мм.

4. Выпускают Синбиотик D-C расфасованным по 10 капсул в блистеры, упакованные в картонные коробки по 1 или 5 блистеров.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, массы нетто, номера партии, сведений о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, надписи: «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят кормовую добавку в упаковке организации-производителя в хорошо вентилируемом, защищенном от света месте, при температуре от 0^0C до 25^0C и относительной влажности не более 65%.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Запрещается использовать кормовую добавку Синбиотик D-C по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Штамм *Enterococcus faecium,* входящий в состав кормовой добавки, нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта животных за счет конкурентного исключения условно-патогенных бактерий, стимулирует местную иммунную систему слизистых, нормализует процессы пищеварения. Гуммиарабик (полисахариды акации) и фруктоолигосахариды являются природными, полностью растворимыми пищевыми волокнами, которые в неизменном виде достигают толстой кишки, где стимулируют рост полезной пробиотической микрофлоры (бифидо- и лактобактерий), а также способствуют активизации процессов пищеварения и улучшают физиологическое состояние организма животных.

III. Порядок применения

6. Синбиотик D-C применяют для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта у собак.

7. Синбиотик D-C назначают собакам по 1 капсуле в течение 10 дней перорально, индивидуально в смеси с кормом.

8. При применении кормовой добавки Синбиотик D-C в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено.

9. Кормовая добавка Синбиотик D-C совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

Рекомендации при приеме в сочетании с антибиотиками - через 2 часа после введения дозы антибиотика, т.к. антибиотики могут снизить жизнеспособность и, следовательно, эффективность пробиотических микроорганизмов. Эффективность антибиотика в этом случае останется неизменной.

IV. Меры личной профилактики

10. При работе с кормовой добавкой Синбиотик D-C следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

11. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: «ADM Protexin® Ltd.», United Kingdom, Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH.

Наименование и адрес организации-производителя: «ADM Protexin® Ltd.», United Kingdom, Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки Протексин Синбиотик D-C, утвержденная Россельхознадзором 13 апреля 2015 г.

Регистрационный номер ПВИ–2–3.15/04536