

24.11.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Силта.
(Организация-разработчик: ООО «ФармБаланс», 117186, г. Москва, ул.
Нагорная, 3а, 5/1/27)

Номер регистрационного удостоверения:
77-3-24.25-5399 N ПБР-3-24.25/04144

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Силта (Silta).
Международное непатентованное наименование: телмисартан.
2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.
В качестве действующего вещества Силта в 1 мл содержит телмисартан – 4 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензалкония хлорид, гидроксиэтилцеллюлоза, мальтитол и вода очищенная.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную вязкую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 (три) года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 дней.
Силту запрещается применять по истечении срока годности.
4. Препарат выпускают в полимерных флаконах по 30 и 60 мл с винтовой горловиной, закрытых полимерными навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия и пробкой-адаптером. Каждый флакон поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению и дозирующим приспособлением (шприцем-дозатором).
5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 8 до 25 °С.
6. Силту следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Препарат «Силта» относится к клинко-фармакологической группе антагонисты рецепторов ангиотензина II.

10. Телмисартан - специфический антагонист рецепторов типа AT 1 ангиотензина II, который вызывает дозозависимое уменьшение артериального кровяного давления у млекопитающих, в том числе у собак и кошек, и снижает протеинурию.

Телмисартан вытесняет ангиотензин II из его связи с AT1 рецептором. Телмисартан избирательно связывается с AT1 рецептором и при этом не соединяется с другими AT рецепторами. Стимуляция AT 1 рецептора ответственна за патологические эффекты ангиотензина II в почках и других органах, связанных с ангиотензином II, такие как вазоконстрикция (сужение кровеносных сосудов), задержка натрия и воды, увеличенный синтез альдостерона и изменения в органах. При этом эффекты, связанные со стимуляцией A T2 рецептора, такие как вазодилатация, натрийурез и ингибирование несоответствующего клеточного роста, не подавляются.

При пероральном применении кошкам телмисартан быстро всасывается, достигая максимума концентрации в плазме через 0,5-1 час. Потребление корма существенно не влияет на общую степень абсорбции телмисартана. Телмисартан - это липофильное соединение, которое имеет способность к мембранной проницаемости, что облегчает естественное распределение в тканях и органах. Связывание рецептора сохраняется длительное время благодаря медленной диссоциации телмисартана из его связи с AT1 рецептором. Особенности действия препарата на животных различного пола не выявлено.

Клинически значимого накопления препарата в органах и тканях при длительном его применении (в течение 21 дня) не наблюдается. Абсолютная биодоступность после перорального применения 33%. Телмисартан связывается с белками плазмы (>99,5%), преимущественно с альбумином и а-1-кислотным гликопротеином. Период полувыведения в среднем составляет 7, 7 часа.

Телмисартан метаболизируется в печени в фармакологически неактивный глюкуронид (1-О-ацилоглюкуронида телмисартана). Выводится из организма преимущественно с фекалиями.

По степени воздействия на организм препарат относится к веществам малоопасным (5 класс опасности по ГОСТ 32296-2013).

III. Порядок применения

11. Препарат применяют кошкам для снижения уровня протеинурии при хронической болезни почек (ХБП) и лечения системной гипертензии, собакам - для снижения уровня протеинурии при ХБП.

12. Препарат не применяют животным с гиперчувствительностью к действующему и/или вспомогательным веществам.

Препарат следует назначать с осторожностью при хронической сердечной недостаточности, гиповолемии, гипонатриемии, гиперкалиемии. В этих случаях необходимы периодические обследования ветеринарного врача и контроль показателей крови.

13. При работе с Силтой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Силты следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не применяется беременным и кормящим кошкам и собакам, а также животным моложе 6-месячного возраста.

15. Препарат применяют кошкам и собакам, достигшим 6-месячного возраста, перорально один раз в сутки в дозе 0,25 мл на кг массы тела (1 мг/кг по телмисартану).

Хроническая болезнь почек (ХБП).

Рекомендуемая доза для кошек и собак составляет 1 мг телмисартана/кг массы тела животного (т. е. 0,25 мл препарата/кг массы тела животного). У животных с тяжелым поражением почек, получающих препарат Силта, рекомендуется периодически контролировать функцию почек (концентрацию креатинина в плазме).

Системная гипертензия.

Начальная рекомендуемая доза составляет 2 мг телмисартана/кг массы тела животного (т. е. 0,5 мл препарата/кг массы тела животного).

У кошек с систолическим артериальным давлением (САД) менее 140 мм рт. ст. по усмотрению ветеринарного врача дозу телмисартана можно снижать пошагово по 0,5 мг/кг каждые 4 недели с регулярным контролем САД.

Если САД увеличивается в течение заболевания, суточная доза может быть снова увеличена до 2 мг/кг (т. е. до 0,5 мл препарата/кг массы тела животного).

Целевой диапазон САД для назначения Силты составляет от 120 до 140 мм рт. ст. Доза телмисартана должна быть уменьшена, если систолическое артериальное давление (САД) постоянно ниже 120 мм рт. ст. или при наличии сопутствующих признаков гипотензии.

У кошек с гипертензией рекомендуется проводить регулярный контроль артериального давления.

Препарат вводят при помощи шприца-дозатора непосредственно в ротовую полость. Возможно применение препарата с небольшим количеством корма.

После отбора препарата нужно плотно закрыть флакон, промыть шприц водой и дать ему просохнуть.

Терапевтическую дозу и продолжительность курса лечения в зависимости от физического состояния животного и течения заболевания определяет лечащий ветеринарный врач. Длительность курса лечения не ограничена.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией в отдельных случаях у животных может наблюдаться лёгкая и/или периодическая отрыжка, рвота, диарея или разжиженный стул, гипотония и понижение количества эритроцитов в крови.

В очень редких случаях наблюдается повышение уровня печеночных ферментов, которое приходит в норму в течение нескольких дней после приостановления терапии. В связи с этим необходимо контролировать показатели крови в течение всего периода лечения.

При индивидуальной повышенной чувствительности животного к препарату и появлении аллергических реакций, применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. В случае передозировки препарата у животных может наблюдаться отрыжка, рвота, диарея или разжиженный стул, гипотония, снижение количества эритроцитов. В редких случаях у собак отмечается появление побочных эффектов в виде усиления жажды.

18. Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами. Силта может применяться в комплексной терапии хронической болезни почек с другими этиологическими и симптоматическими лекарственными средствами. Телмисартан может усиливать гипотензивный эффект других антигипертензивных препаратов.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлены.

20. При случайном увеличении интервала между приемом препарата его необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной дозе. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «АлексАнн»
Адрес: 141705, Московская обл., г.
Долгопрудный, Виноградная ул., 13.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «ФармБаланс»
Адрес: 117186, г. Москва, ул.
Нагорная, 3а, 5/1/27.

Представитель ООО «ФармБаланс»



Сычева А.И.