

Шиерия® Shieria®




Маропитант (в форме цитрата моногидрата) 10 мг/мл

- Купирует рвоту различного генеза
- Оптимизированная формула снижает болевые ощущения при введении
- Можно применять внутривенно и подкожно
- Удобная фасовка
- Оптимальная дозировка 1мл на 10 кг веса животного
- Биодоступность препарата после подкожного введения составляет 90%
- После подкожного введения эффект достигается через 45 минут
- Срок хранения флакона после вскрытия 90 дней

По вопросам приобретения обращайтесь
к официальным дистрибьюторам
ООО «Миралек – Фарма»
info@miralek.vet www.miralek.vet

НОВИНКА!



Шиерия®

Shieria®



Проверенное и эффективное средство для коррекции рвоты различного происхождения у кошек и собак теперь безболезненно при подкожных инъекциях, а также его можно применять внутривенно.

СОСТАВ: действующее вещество в 1 мл содержит маропитант (в форме цитрата моногидрата) 10 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензиловый спирт, сульфобутиловый эфир (В- циклодекстрина и воду для инъекций.)

МАРОПИТАНТ является антагонистом нейрокининовых рецепторов КК1 и ингибирует связывание субстанции Р - нейропептида из 11 аминокислот тахикининовой группы в ЦНС. Маропитант эффективен в предотвращении рвоты как центрального, так и периферического генеза.

Биодоступность маропитанта после подкожного введения составляет 90%.

ПРЕПАРАТ ШИЕРИЯ назначают собакам и кошкам для предотвращения тошноты и рвоты различного генеза, в том числе вызванной применением химиотерапевтических средств, транспортировкой животного (синдром укачивания) и при парвовирусном энтерите. Применение препарата эффективно для предотвращения периоперационной тошноты и рвоты и улучшения восстановления после анестезии, вызванной применением агонистов μ -опиатных рецепторов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: препарат вводят животным подкожно или внутривенно в дозе 1 мг/кг веса животного, что соответствует 1 мл препарата на 10 кг массы животного, один раз в сутки в течение не более 5 суток. При внутривенном введении препарат вводят в течение 1-2 минут без предварительного разведения в каких-либо жидкостях.

ШИЕРИЯ по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

ФОРМА ВЫПУСКА: флаконы из темного стекла по 10 и 20 мл

ХРАНЕНИЕ: В закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °C до 25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня производства. Срок годности после отбора из флакона части препарата, при соблюдении условий асептики и условий хранения - 90 дней.

1 Nynke Deckers, Catharina A Ruigrok, , Hans Peter Verhoeve, Nicky Lourens

Comparison of pain response after subcutaneous injection of two maropitant formulations to beagle dogs

First published: 17 February Vet Rec: e000262. doi: 10.1136 / vetreco-2017-000262. PMID: 29531751; PMCID: PMC5845409.